



# Avertissements Agricoles®

Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation

DLP 27-10-97030317

## Bourgogne et Franche-Comté

Bulletin n° 26/97 - 22 octobre 1997

### COLZA

**Stades** : de B5-B6 (5 à 6 feuilles) à B8-B10 (8 à 10 feuilles) ; avec la disparition des feuilles les plus anciennes, même les parcelles les plus avancées dépassent rarement 8 à 11 feuilles.

### Ravageurs

Les **pucerons** poursuivent leur progression dans des situations non traitées et dans des parcelles ayant reçu un insecticide depuis plus de 10-15 jours. On observe toujours la présence de *Myzus* ailés dans les cultures. Des captures sont également encore observées à la tour d'Auxerre.

Le **charançon du bourgeon terminal** a commencé son vol depuis les 16-19 octobre. Des captures sont enregistrées dans la plupart des secteurs.

#### Captures de charançon

du bourgeon terminal au 20/10/97	
21 Lux	0
Binges	0
Duesmes	7
Fontaines en Duesmois	2
Savigny	0
Vignolles	8 (4 le 16/10)
Chaux	2 (1 le 17/10)
Corgoloin	0
Comblanchien	1
Franxault	1
25 Routelle	0
39 St Aubin (2 postes)	0
St Baraing	1
Vaudrey	0
Amange	5
Annoire	0
Authume	3
58 Diennes Aubigny	0
Guerigny	0
La Charité S/Loire	1
70 Port S/Saône	1
Cugney	4 (19/10)
Fédry	0
Vrègille	5 (19/10)
Pesmes	0
Rigny	5
Valay	0
71 Chatenoy le Royal	0
St Loup de la Salle	0
St Maurice en Rivière	0
Rully	0
89 Ancy le Franc	2
Auxerre	0
Auxerre-Venoy	2
Cruzy le Chatel	0
Flogny la Chapelle	0
Pourrain	0
Sens	0
Beigny le Chateau	13
Piffonds	0
Mere	5

Rappelons que le piégeage est surtout destiné à observer le déroulement du vol du charançon ; il n'existe en effet pas de relation entre l'importance des captures sur un site et le risque de dégâts sur la culture.

**Préconisations** : En tous secteurs une intervention est à envisager 10 jours après les premières captures, soit dès la fin de cette semaine (25 octobre) ou au tout début de la semaine prochaine (27 octobre).

Si le seuil de 20 % de pieds porteurs de pucerons est franchi, prendre en compte le risque pucerons dans le choix du produit.

Pour les parcelles ayant reçu une protection anti-pucerons postérieure au 15 octobre, comportant un produit efficace sur charançon du bourgeon terminal, le renouvellement de la protection insecticide ne se justifie pas actuellement.

### CEREALES

**Stades** : Les semis sont maintenant assez avancés (sauf précédent betterave) ; les levées se poursuivent ; les situations les plus avancées - blés et orges d'hiver semés avant ou vers le 20 septembre peuvent atteindre 2 talles, les semis de début octobre atteignent en général 1 à 2 feuilles.

### Ravageurs

On note une remontée des captures de **pucerons** (*Rhopalosiphum padi*) à la tour d'Auxerre (voir graphe page 2).

La situation dans les cultures est assez variable en tous secteurs pour les parcelles de 1 à 2 feuilles avec des niveaux de 0 à 5-7 % de pieds porteurs de pucerons - essentiellement ailés avec quelques aptères.

En situations plus avancées, des niveaux plus importants, avec parfois début de jeunes colonies, peuvent être observés ; quelques parcelles ont déjà franchi le seuil des 10 % de pieds porteurs :

21-Pouilly s/Saône blé 3 f-1 talle 11 %,  
39-Chaussin blé 3 feuilles 23 %,  
89-Savigny sur Clairis blé 2 f 20 %...

Pour les secteurs sensibles aux **cicadelles** du Nord de l'Yonne et du Centre Nivernais, on observe encore beaucoup d'activité de ces insectes, une présence fréquente en bordure de parcelles et à proximité d'abris. Les captures dans le réseau de cuvettes d'observation n'ont pas diminué avec les pluies et restent à un niveau plus important que ces dernières années.

### COLZA

Intervention contre le charançon.

### CEREALES

Pucerons : protéger les parcelles à plus de deux feuilles.

**Préconisations :** Le seuil de 10 % de pieds porteurs de pucerons est le plus souvent atteint pour les parcelles les plus précoces. Une intervention est à réaliser dans les parcelles non traitées Gauchon qui atteignent 2 à 3 feuilles. Pour les autres situations n'ayant pas atteint ce stade, une intervention est actuellement prématurée et risque de nécessiter un renouvellement ultérieur. Attendre un prochain bulletin.

Pour les situations Yonne et Nièvre exposées au risque cicadelles, rester vigilant et intervenir, le cas échéant, à partir de 1-2 feuilles sur les parcelles présentant des populations importantes.

